

**CIRURGIA**

01.A parede abdominal é composta por quantas camadas?

- a) 9
- b) 8
- c) 7
- d) 6

02.Na análise do líquido ascético, a dosagem do GASA foi de 2,3 g/dL. Qual a provável etiologia nas patologias abaixo?

- a) Cirrose Hepática
- b) Síndrome de Budd-Chiari
- c) Carcinomatose Peritoneal
- d) Mixedema

03.Tumor primário maligno, mais comum:

- a) Sarcoma
- b) Pseudomixoma Peritoneal
- c) Adenocarcinoma
- d) Mesotelioma

04.A hérnia classificada como Nyhus II

- a) Inguinal Direta
- b) Inguinal Indireta
- c) Femural
- d) De deslizamento

05.São técnicas “Tension Free”, **EXCETO**:

- a) Lichtenstein
- b) Andrews
- c) Stoppa
- d) Guilbert

06.O Sinal de Ten Horn é encontrado em qual patologia?

- a) Apendicite Aguda
- b) Coledocolitíase
- c) Tumor peri-ampular
- d) Hemoperitoneo

07.No sangramento do trato Gastrointestinal proximal ao ligamento de Treitz, a causa mais comum é?

- a) Doença ulcero-péptica
- b) Varizes de esôfago
- c) Neoplasias
- d) Lacerações de Mallory-Weiss

08.O método diagnóstico para Hemobilia:

- a) Endoscopia Digestiva

- b) Cápsula Endoscópica
- c) CPRE
- d) Angiografia

10.No tratamento das lesões traumáticas cervicais, a de abordagem mais rápida cirurgicamente, está localizada:

- a) Zona I
- b) Zona III
- c) Zona II
- d) Zona IV

11.A hemi secção da medula vertebral, caracteriza a Síndrome:

- a) Verner-Morrison
- b) Beckwith-Wiedemann
- c) Brown-Sequard
- d) Crouzon

12. A Síndrome Hepato Renal é consequência de:

- a) Severa Redução da perfusão sanguínea renal
- b) Obstrução glomerular por sais biliares
- c) Alterações no sistema renina angiotensina
- d) Supressão da atividade da glândula supra - renal

13. A etiologia da Cirrose biliar primária é:

- a) Autoimune
- b) Colangite esclerosante
- c) Calculo residual do colédoco
- d) Hepatites virais de repetição

14. O tratamento das Hemorroidas ganfrenas requer?

- a) Hemorroidectomia nas primeiras 24 horas.
- b) Ligadura Elástica.
- c) Escleroterapia e posterior cirurgia.
- d) Calor local, analgesia e creme heparinóide local

15. Qual conduta deve ser considerada na mulher grávida 34ª semana com diagnóstico apendicite aguda?

- a) Antibióticoterapia por 3 dias e posterior apendicectomia.
- b) Antibióticoterapia, reposição hidroeletrólítico e analgesia
- c) Apendicectomia imediata
- d) Punção guiada, por tomografia para drenagem de provável e abscesso.

16. A maioria dos tumores do apêndice cecal localizados em sua porção proximal é do tipo histológico:

- a) Carcinóide
- b) GIST
- c) Adenocarcinoma
- d) Cistoadenoma mucinoso

17. Os pseudo pólipos inflamatórios são encontrados na:

- a) Doença de CRONHN
- b) Colite amebiana
- c) Retocolite ulcerativa crônica
- d) Megacolon decorrente do mal de chagas

18. A cirurgia na pancreatite crônica tem como indicação:

- a) Diarréia crônica
- b) Correção da hiperglicemia
- c) Restabelecimento da função exócrina da glândula, evitando má absorção pancreática
- d) Dor e suspeita de câncer

19. A lesão de dieulafoy corresponde a:

- a) Lesão da mucosa retal secundária á colite amebiana
- b) Sangramento de fístulas arteriovenosas no intestino grosso.
- c) Erosão esofágica por ingestão de cáusticos
- d) Sangramento por ruptura da artéria tortuosa gástrica submucosa

20. O Linfoma do trato gastrointestinal tem localização mais frequente no:

- a) Colon
- b) Estômago
- c) Íleo terminal
- d) Jejuno proximal